

Avertissements[®]

agricoles



Auvergne

ISSN : 0763 - 7756

Grandes cultures

Le 16 Mars 1990

N° 4

COLZA
 Meligèthes: vols importants
 Pucerons cendrés: déjà présents.
POIS
 Sitones: à surveiller
CEREALES
 Raccourcisseurs-si risques de verse

COLZA

	Entre-noeuds visibles C2 (situation tardive)
Stades	Boutons accolés cachés D1
	Boutons accolés visibles D2

MELIGETHES

★ Situation

- Captures précoces (dès le 20/02) et très importantes localement très récemment (les 6, 7 et 12 Mars).
- Les insectes sont cachés dans l'intérieur des feuilles terminales autour des boutons floraux. Les morsures entraînent l'avortement de ceux-ci (recherche du pollen).

★ Préconisation

Le colza est particulièrement sensible aux méligèthes actuellement, et ce jusqu'à l'ouverture des 1ères fleurs (F1).

Visitez vos parcelles. Soyez vigilants dès que le traitement charançon de la tige remonte à plus de 15 jours. Examinez les inflorescences.

Intervenir dès que le seuil d'un insecte par inflorescence est atteint au stade D1. Ce seuil est de 2 à 3 insectes par inflorescence du stade D2 à E.

CHARANCONS DE LA TIGE

★ Situation

- . Toujours quelques captures en cuvette jaune.
- . Les piqûres de pontes sont bien visibles.

★ Préconisation

Le colza est sensible jusqu'au stade tige 20 cm de hauteur. Ce stade est pratiquement atteint. Le traitement conseillé dans notre dernier bulletin est suffisant vu la croissance rapide des plantes.

PUCERONS CENDRES

✪ Situation

Des infestations fortes sont notées localement.
Les pucerons sont situés dans les inflorescences sur les colzas au stade D1.

✪ Préconisation

Intervenir dès que l'on dénombre plus de 2 colonies/m².
Choisir un insecticide adapté à la situation actuelle de vos parcelles (présence ou absence de méligèthes).

Produits :

- spécifiques : SERK - PIRIMOR.
- polyvalents : matières actives : bromophos, fluvalinate, phosalone, lindane + parathion méthyl.

N.B.- Conserver la fiche jointe "Ravageurs du Colza".

POIS

Stades : levée à 2 - 4 cm de hauteur.

SITONES

✪ Situation

De nombreuses morsures sont notées dans beaucoup de situations.

✪ Préconisation

Intervenir dès que l'on note la présence de nombreuses morsures sur la totalité des premières feuilles.

Produits : SUMICIDIN : 0,5 litre
DECIS : 0,3 litre

FASTAC : 0,25 litre
KARATE : 0,125 litre

CEREALES

Stades Tallage - 4
 Redressement - 5
 Epi à 1cm

RACCOURCISSEURS

Il sont à utiliser uniquement en situations de risque de verse: forte densité, fumure azotée excessive, variétés sensibles. Les spécialités du type C3 ou C5 (Cycocel, Bref...) s'appliquent par temps poussant au stade épi à 1 cm.

Fendre plusieurs maître-brins (au rasoir) pour déterminer le bon stade.

Consulter le dépliant vert "ITCF - SPV".